HüftsonoGRAFie modifiziert nach SMOPP*

SVUPP | ASEPA | ASEPP

Name _____

Geb. Datum _____ Alter _____ Testdatum _____

Anamnese/Klinik _____

*SMOPP: Swiss Mongolian Pediatric Project: www.smopp.net

SMOPP		Graf		Alter	Knöcherne Form-gebung	Knöcherne Erkerform	Knorpeliger Erker			Procedere
Gruppe	α	Typ						α	β	
A	≥ 60°	Ia	Reife Hüfte	jedes	gut	eckig	übergreifend	> 60°	< 55°	entlassen
		Ib				stumpf			> 55°	
B	bis. 10. Woche: α - (minus) Alter in Wochen ≥ 50°< 60°	IIa (+)	Physiologisch unreif	bis 12. Woche (ab 6.-12. Woche)	ausreichend	rund	breit übergreifend	50°-59°	> 55°	Kontrolle
C	< 50° oder α- (minus) Alter in Wochen < 50°	IIa (-)	Reifungsdefizit		mangelhaft		verbreitert übergreifend			Spreizhose
		IIb	Verknöcherungsverzögerung	ab 4. Monat						
		IIc	Gefährdet	jedes	hochgradig mangelhaft	rund bis flach	noch übergreifend	43°-49°	< 77°	
		D	Am dezentrieren		schlecht		verdrängt		> 77°	
		IIIa	Dezentriert			flach	nach ↑ verdrängt ohne Strukturstörung	< 43°		
		IIIb					nach ↑ verdrängt mit Strukturstörung			
D	-	IV					nach ↓ verdrängt mit Strukturstörung			Spreizhose Reposition





links: X rechts: 0

stabil instabil

Beurteilung / Procedere

_____

_____

_____

Ärztin/Arzt _____